

入院説明書(患者・ご家族用)

病名(右・左) 滲出性中耳炎(鼓膜チューブ挿入・抜去術)

患者氏名

様

	入院日 / (手術前日 /)	手術当日 /	退院(術後1日目) /		
	<ul style="list-style-type: none"> 手術、麻酔について理解できる 心身共に手術を受ける準備ができる 	<ul style="list-style-type: none"> 術前準備が順調に進み、手術に至る 手術後の呼吸・脈拍・血圧が安定する 痛みのコントロールが出来る 点滴・抗生剤の治療を確実に受けることができる 	<ul style="list-style-type: none"> 発熱など感染の症状がない 内服薬を確実に飲むことができる 退院後の生活の留意点が理解できる 		
治療処置	<ul style="list-style-type: none"> ネームバンドを装着します 全身状態を観察します (体温・血圧測定・皮膚の状態など) シャワー後、足に名前を書きます * 通常、オムツを使用している場合は、手術室に持っていくオムツを1枚預かります 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> (手術前) ・おしっこを済ませ、術衣に着替えます () お薬を飲みます () おしりからお薬を入れます </td> <td style="width: 50%; border: none;"> (手術後) ・帰室時、30分後、60分後に検温をします ・痛みが強い時、興奮時は痛み止めや鎮静剤を使用することがあります ・耳に綿球が入ってきます ・状態が落ち着いており、夕食を食べることができたら、夕食後に点滴がとれます ・夕食後から抗生剤の内服が開始になります </td> </tr> </table>	(手術前) ・おしっこを済ませ、術衣に着替えます () お薬を飲みます () おしりからお薬を入れます	(手術後) ・帰室時、30分後、60分後に検温をします ・痛みが強い時、興奮時は痛み止めや鎮静剤を使用することがあります ・耳に綿球が入ってきます ・状態が落ち着いており、夕食を食べることができたら、夕食後に点滴がとれます ・夕食後から抗生剤の内服が開始になります	<ul style="list-style-type: none"> 術後1日目に退院予定です 退院日は朝から耳鼻科外来で診察があります 看護師がお知らせします 退院の時間は午前中になりますが、ご都合の悪い方はご相談下さい 
(手術前) ・おしっこを済ませ、術衣に着替えます () お薬を飲みます () おしりからお薬を入れます	(手術後) ・帰室時、30分後、60分後に検温をします ・痛みが強い時、興奮時は痛み止めや鎮静剤を使用することがあります ・耳に綿球が入ってきます ・状態が落ち着いており、夕食を食べることができたら、夕食後に点滴がとれます ・夕食後から抗生剤の内服が開始になります				
食事	<ul style="list-style-type: none"> 普通食 * 入院中の持込み食は衛生上禁止しております 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> (手術前) 絶飲食の時間 食事は()まで ミルクは()まで 水分は()まで →お水・お茶・ポカリのみ *以降は絶飲食になります </td> <td style="width: 50%; border: none;"> (手術後) 水分の開始時間: 食事の開始時間: *最初の食事はお粥です *吐き気があったり吐いた場合には時間が変更になることがあります </td> </tr> </table>	(手術前) 絶飲食の時間 食事は()まで ミルクは()まで 水分は()まで →お水・お茶・ポカリのみ *以降は絶飲食になります	(手術後) 水分の開始時間: 食事の開始時間: *最初の食事はお粥です *吐き気があったり吐いた場合には時間が変更になることがあります	 <p style="text-align: center;">普通食</p>
(手術前) 絶飲食の時間 食事は()まで ミルクは()まで 水分は()まで →お水・お茶・ポカリのみ *以降は絶飲食になります	(手術後) 水分の開始時間: 食事の開始時間: *最初の食事はお粥です *吐き気があったり吐いた場合には時間が変更になることがあります				
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内自由です 検査・診察以外は病室内でお過ごし下さい 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> (手術前) ・眠るお薬を使ったらベッド上で安静にします </td> <td style="width: 50%; border: none;"> (手術後) ・麻酔からしっかり目がさめたら歩くことができます ・点滴がとれたら手足の固定(抑制)も外します ・歩行開始時はふらつくことがありますのでご注意ください </td> </tr> </table>	(手術前) ・眠るお薬を使ったらベッド上で安静にします	(手術後) ・麻酔からしっかり目がさめたら歩くことができます ・点滴がとれたら手足の固定(抑制)も外します ・歩行開始時はふらつくことがありますのでご注意ください	<ul style="list-style-type: none"> 病棟内自由です 検査・診察以外は病棟内でお過ごし下さい 
(手術前) ・眠るお薬を使ったらベッド上で安静にします	(手術後) ・麻酔からしっかり目がさめたら歩くことができます ・点滴がとれたら手足の固定(抑制)も外します ・歩行開始時はふらつくことがありますのでご注意ください				
清潔	シャワーができます	手術当日はシャワーや体拭きはできません			
説明	<ul style="list-style-type: none"> 病棟オリエンテーションを行います 入院診療計画書の説明を行います 麻酔科医、手術室看護師が説明に伺います 薬剤師が薬の説明に伺います 術前説明を行います  <p>* 入院費についてご不明な点は、医事課にご確認下さい</p>	<ul style="list-style-type: none"> (手術中) ・3階待合室でお待ち下さい(病院外には出ないようお願いします) (手術後) ・担当医より手術についての説明があります ・安全と安静を守る為に手足の固定(抑制)を行うことがあります ・吐いた時は誤嚥しないように顔を横に向けてください 	<p>担当医・看護師からの退院の説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手術後、数日は血液の混じった耳だれが出るがありますが、問題ありません ・耳だれが多かったり、ねばっこい場合は、チューブが抜けることがあります 再来時に確認します ・耳の中に水が入らないように注意して下さい(入浴、洗髪、プールなど) ・チューブは原則的に1～2年入れておきます 状態が落ち着けば、3～4ヵ月毎の診察になります その間はおかかりつけ医での診察になります ・外出制限は特にありません 運動、登校、通園は担当医にご確認下さい ・通常、チューブを抜いた穴は、1～3ヶ月で自然にふさがりますが個人差があります ・長期間、穴が残る場合は、閉じる手術が必要になることもあります ・内服薬については、看護師が説明後、お渡しします * 再来日は1週間後になります その時にチューブの位置を確認します * ご心配な点がございましたらご連絡下さい <p style="text-align: right;">TEL: 092-682-7000(代表)</p> 		

* この表は、病状により変更することがあります。ご不明な点がございましたら担当医、看護師にお尋ね下さい